

Patientvejledning

Kikkertundersøgelse af mavesækken - Gastroskopi

MAVETARMKLINIKKEN FAXE APS

v/speciallæge, Ulrich Bang, Ph.d.

Præstøvej 78, 4640 Faxe,

tlf. 71 99 27 95

CVR 39782561 Yder-nummer 229172

Dato og tid for undersøgelsen:



Du skal have lavet en kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Her kan lægen se det indvendige af dit spiserør, mavesæk og tolvfingertarm og evt. tage vævsprøver.

Forberedelse

Du skal møde FASTENDE.

- Indtil 6 timer før mødetid må du spise.
- Indtil 2 timer før mødetid må du drikke vand, saftvand og the. Du skal undgå kaffe og mælkeprodukter.
- Du må ikke tygge tyggegummi, spise halspastiller eller ryge 2 timer før mødetid.
- Nødvendig medicin i form af tabletter må indtages som vanligt med få mundfulde vand.

Sukkersyge - ingen medicin på dagen

Hvis du får medicin mod sukkersyge, skal du ikke tage medicinen - tabletter/insulin, den dag du skal undersøges med mindre du har aftalt noget andet med lægen.

Hvis du får blodfortyndende medicin

Hvis du får Marcoumar, Marevan eller Plavix skal du ringe til os.

Hvis du er i behandling med Marcoumar eller Marevan og har haft problemer med at regulere din dosis, skal du have taget en blodprøve (INR værdi) højst 3 dage før undersøgelsen.

Du skal ikke holde pause med den blodfortyndende medicin (Marevan, Marcoumar, Plavix, Hjertemagnyl, Persantin).

Hvis du får mavesårsmedicin

Du kan fortsætte med medicin mod for meget mavesyre (f.eks. pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol) hvis du allerede får dette.

Undersøgelsen

Du ligger på venstre side, mens undersøgelsen foretages. Løse tandproteser og evt. tungepiercing tages ud.

Umiddelbart inden undersøgelsen får du en lokalbedøvelse i svælget i form af spray. Herved mindskes ubehagelige reflekser, når kikkerten føres ned. Hvis undersøgelsen skal foretages via næsen vil vi også anvende lokalbedøvelse i næsen.

Undersøgelsen udføres med en lillefingertyk bøjelig kikkert (gastroskop). Denne føres via munden ned i spiserøret, mavesækken og videre til tolvfingertarmen. I nogle tilfælde er det muligt at føre kikkerten via næsen.

Ved hjælp af en lille tang kan der helt smertefrit tages vævsprøver af slimhinden. Undersøgelsen er kortvarig, ca. 3-4 minutter.

Den gør ikke ondt at få foretaget, men kan være forbundet med et vist ubehag.

Efter undersøgelsen

Du skal fortsat være fastende 1 time efter undersøgelsen, da den lokalbedøvende medicin du har fået i svælget, kan medføre risiko for fejlsynkning.

Svar på undersøgelsen

Du vil umiddelbart efter undersøgelsen få en kort orientering om undersøgelsens resultat. Din egen læge vil blive informeret skriftligt.

Samtykke

Med min underskrift giver jeg samtykke til undersøgelsen, accepterer de eventuelle risici og erklærer, at have læst vejledningen.

GDPR: Endvidere samtykker jeg til at Mavetarmklinikken Faxe Aps kan opbevare mine personoplysninger iht. Persondataforordningen og Journalføringsbekendtgørelsen.

Dato og navn

CPR-nummer